

УДК 517.956

ПРО ОДНУ ЗАДАЧУ ДЛЯ НАВАНТАЖЕНОЇ ГІПЕРБОЛІЧНОЇ СИСТЕМИ НАПІВЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ З ГОРИЗОНТАЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Ольга ПЕЛЮШКЕВИЧ

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1 79000 Львів, Україна*

Розглянуто розв'язність мішаної задачі для навантаженої напівлінійної гіперболічної системи рівнянь першого порядку з горизонтальними характеристиками. Методом характеристик задача зведена до системи інтегро-операторних рівнянь Вольтерра другого роду, для якої за допомогою теореми Банаха про стискуjące відображення визначено достатні умови існування глобального неперервного розв'язку задачі.

Ключові слова: гіперболічна система, метод характеристик, напівлінійні рівняння, теорема Банаха.

Вступ. Незважаючи на свій півторастолітній розвиток, у теорії гіперболічних рівнянь і систем виникають нові задачі. До таких задач варто зачислити і мішані задачі для гіперболічних систем рівнянь першого порядку з двома незалежними змінними, в яких можуть бути вироджені (горизонтальні або вертикальні) характеристики.

Ці задачі є цікавими, оскільки вони з'являються в проблемах з малим параметром у вироджених випадках [1, 2]. Крім того, задачі з горизонтальними характеристиками (вертикальними) є математичними моделями багатьох процесів фізики, механіки, гідро- та газодинаміки, біології тощо [3, 4]. Проблема вироджених характеристик виникає також при зведенні гіперболічних систем квазілінійних рівнянь до канонічної форми Шаудера (характеристична канонічна форма) [5].

Використовуючи підхід, запропонований в [6], ми побудуємо єдиний розв'язок мішаної задачі для гіперболічної системи напівлінійних навантажених рівнянь з горизонтальними характеристиками у всій розглядуваній області. Запропоновано метод, який допоможе уникнути відомої проблеми про те, що в мішаних задачах для гіперболічних систем виникають особливості (лінії розриву) навіть для гладких вихідних даних, у випадку побудови неперервних розв'язків для всіх $t > 0$ [5].

Формулювання задачі. В області $G = \{(x, t) : 0 < t < T, -kt < x < kt + l\}$, T, k, l – додатні сталі, розглядаємо систему рівнянь

$$\begin{aligned} & \frac{\partial u}{\partial t} + \Lambda(x, t) \frac{\partial u}{\partial x} = \\ & = f(x, t, u(x, t), v(x, t), u(-kt, t), v(-kt, t), u(kt + l, t), v(kt + l, t)), \end{aligned}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = g(x, t, u(x, t), v(x, t), u(-kt, t), v(-kt, t), u(kt + l, t)), \quad (1)$$

де $u = (u_1, \dots, u_m)^T$, $f = (f_1, \dots, f_m)^T$, $v = (v_1, \dots, v_n)^T$, $g = (g_1, \dots, g_n)^T$, $\Lambda(x, t) = \text{diag}(\lambda_1(x, t), \dots, \lambda_m(x, t))$.

Для системи (1) задамо початкові умови

$$u(x, 0) = q(x), \quad (q = (q_1, \dots, q_m)), \quad 0 \leq x \leq l. \quad (2)$$

Визначимо множини індексів

$$I_0 = \{i \in \{1, \dots, m\} : \lambda_i(0, t) > -k\}, \quad I_l = \{i \in \{1, \dots, m\} : \lambda_i(l, t) < k\}$$

та запишемо крайові умови у вигляді

$$\begin{aligned} u_i(-kt, t) &= \gamma_i^0(t, (u(-kt, t))_{s \notin I_0}), \quad i \in I_0, \\ u_i(l + kt, t) &= \gamma_i^l(t, (u(l + kt, t))_{s \notin I_l}), \quad i \in I_l, \end{aligned} \quad (3)$$

$$v(-kt, t) = \psi(t, (u(-kt, t))_{s \notin I_0}), \quad (\psi = (\psi_1, \dots, \psi_n)). \quad (4)$$

Нехай множини I_0, I_l містять відповідно r_0 та r_l елементів. Вважатимемо, що всі задані функції

$$f : \bar{G} \times R^{3m+3n} \rightarrow R^m, \quad g : \bar{G} \times R^{3m+2n} \rightarrow R^n, \quad \lambda_i : \bar{G} \rightarrow R^m, \quad q : [0, l] \rightarrow R^m,$$

$$\gamma^0 : [0, T] \times R^{r_l} \rightarrow R^{r_0}, \quad \gamma^l : [0, T] \times R^{r_0} \rightarrow R^{r_l}, \quad \psi : [0, T] \times R^{r_l} \rightarrow R^n$$

є неперервними, а функції λ_i , крім того, задовольняють умову Лівшиця за змінною x . Також виконується співвідношення

$$(\lambda_i(-kt, t) + k)(\lambda_i(l + kt, t) - k) \neq 0, \quad t \in [0, T], \quad i \in \{1, \dots, m\}.$$

Глобальна розв'язність задачі. Позначимо через $\phi_i(t; x_0, t_0)$, $i \in \{1, \dots, m\}$ розв'язок задачі Коші

$$\frac{dx}{dt} = \lambda_i(x, t), \quad x(t_0) = x_0$$

і назвемо їх характеристиками системи (1). Для зручності введемо позначення $\phi_i(t) := \phi_i(t; x_0, t_0)$. Через $\chi_i(x_0, t_0)$ позначимо найменше t , для якого в $\bar{G}$ визначений розв'язок $x = \phi_i(t; x_0, t_0)$. Крім того, зазначимо, що

другий блок системи (1) має також сім'ю горизонтальних характеристик вигляду $t = t_0$.

Введемо області

$$\begin{aligned} G_q^i &= \{(x, t) \in G : \chi_i(x, t) = 0\}, i \in \{1, \dots, m\}, \\ G_0^i &= \{(x, t) \in G : \chi_i(x, t) > 0, \phi_i(\chi_i(x, t); x, t) = -k\chi_i(x, t)\}, i \in I_0, \\ G_l^i &= \{(x, t) \in G : \chi_i(x, t) > 0, \phi_i(\chi_i(x, t); x, t) = l + k\chi_i(x, t)\}, i \in I_l. \end{aligned}$$

Проінтегрувавши рівняння системи (1) вздовж відповідних характеристик, зведемо задачу (1)–(4) до системи інтегро-операторних рівнянь

$$\begin{aligned} u_i(x, t) &= F_i[w](x, t) + \\ &+ \int_{\chi_i(x, t)}^t f_i(\phi_i(\tau), \tau, u(\phi_i(\tau), \tau), v(\phi_i(\tau), \tau), u(-k\tau, \tau), \\ &v(-k\tau, \tau), u(k\tau + l, \tau), v(k\tau + l, \tau))d\tau, i \in \{1, \dots, m\}, \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} v_j(x, t) &= \psi_j(t, u(-kt, t)) + \\ &+ \int_{-kt}^x g_j(y, t, u(y, t), v(y, t), u(-kt, t), v(-kt, t), u(kt + l, t))dy, j \in \{1, \dots, n\}, \end{aligned} \quad (6)$$

де

$$F_i[w](x, t) = \begin{cases} q_i(\phi_i(0; x, t)), & (x, t) \in G_q^i, \\ \gamma_i^0(\chi_i(x, t), u(-k\chi_i(x, t), \chi_i(x, t))), & (x, t) \in G_0^i, \\ \gamma_i^l(\chi_i(x, t), u(l + k\chi_i(x, t), \chi_i(x, t))), & (x, t) \in G_l^i. \end{cases} \quad (7)$$

Означення. Узагальненим неперервним розв'язком задачі (1)–(4), будемо називати пару вектор-функцій (u, v) , компоненти яких належать простору $C(\overline{G})$ і задовольняють систему інтегро-операторних рівнянь (5)–(6).

Теорема. Нехай виконуються такі умови:

- $\lambda, f, g, q, \psi, \gamma^1, \gamma^2$ – неперервні вектор-функції на відповідних множинах;
- компоненти вектор-функції λ є ліпшицевими на множині $\overline{G}$ за змінною x ;
- компоненти вектор-функцій $f, g, q, \psi, \gamma^1, \gamma^2$ є ліпшицевими за змінними u, v на відповідних множинах;
- правильне співвідношення

$$(\lambda_i(-kt, t) + k)(\lambda_i(l + kt, t) - k) \neq 0, \quad t \in [0, T], \quad i \in \{1, \dots, m\};$$

– справджується умова погодження

$$\begin{aligned} q_i(0) &= \gamma_i^0(0, q(0)), \quad i \in I_0, \\ q_i(l) &= \gamma_i^l(0, q(l)), \quad i \in I_l. \end{aligned}$$

Тоді існує єдиний узагальнений неперервний розв'язок задачі (1)–(4) у $\overline{G}$.

Доведення. Розглянемо простір Q , пар неперервних функцій $w = (u, v)$ ($u : G \rightarrow R^m, v : G \rightarrow R^n$), позаяк виконуються умови

$$\begin{aligned} u_i(0, 0) &= q_i(0), \quad i \in I_0, \\ u_i(l, 0) &= q_i(l), \quad i \in I_l. \end{aligned}$$

Нехай $\{w^1, w^2\} \in Q$, тоді метрику на елементах простору Q визначимо як

$$\begin{aligned} \rho(w^1, w^2) &= \max \left\{ \max_{i,x,t} |u_i^1(x, t) - u_i^2(x, t)| \alpha_i(x, t) e^{-at}; \right. \\ &\quad \left. \max_{i,x,t} |v_i^1(x, t) - v_i^2(x, t)| \beta_i(x, t) e^{-at} \right\}, \end{aligned} \quad (8)$$

де стали $a > 0$ і неперервні додатні функції α_i, β_i підберемо пізніше.

На елементах простору Q введемо оператор $A = (A^1, A^2)$, який діє за формулою $A[w] = (A^1[u, v], A^2[u, v])$, де оператори A^1 і A^2 визначені, відповідно, правими частинами рівностей (5), (6) (те, що ці оператори переводять неперервні функції в неперервні, випливає з відомих теорем математичного аналізу, а також із неперервності функцій $\phi_i(\tau; x, t)$ та $\chi_i(x, t)$ за всіма аргументами). Отже, пара функцій (u, v) є неперервним узагальненим розв'язком задачі (1)–(4) тоді і тільки тоді, коли $w = (u, v)$ є нерухомою точкою оператора A .

Нехай $w^1 \in Q, w^2 \in Q$. Тоді з формули (8) при всіх допустимих i, x, t одержимо

$$|u_i^1(x, t) - u_i^2(x, t)| \leq \frac{\rho(w^1, w^2)}{\alpha_i(x, t)} e^{at}, \quad |v_i^1(x, t) - v_i^2(x, t)| \leq \frac{\rho(w^1, w^2)}{\beta_j(x, t)} e^{at}.$$

Через L позначимо спільну сталу в умові Ліпшиця для функцій $f, g, \psi, \gamma^0, \gamma^l$, яку запишемо, наприклад, так:

$$|f_i(x, t, u^1, v^1) - f_i(x, t, u^2, v^2)| \leq L \max\{\max_{j,x,t} |u_j^1 - u_j^2|, \max_{j,x,t} |v_j^1 - v_j^2|\}$$

і аналогічно для інших функцій.

Знайдемо коефіцієнт стиску оператора A , для цього виконаємо такі оцінки. Нехай $w^1, w^2 \in Q$. Тоді з (7) отримаємо нерівність

$$|F_i[w^1](x, t) - F_i[w^2](x, t)| \leq \begin{cases} L \max_{j \notin I_0} \frac{\rho(w^1, w^2)}{\alpha_j(-k\chi_i(x, t), \chi_i(x, t))} e^{a\chi_i(x, t)}, & (x, t) \in G_0^i, \\ L \max_{j \notin I_l} \frac{\rho(w^1, w^2)}{\alpha_j(l + k\chi_i(x, t), \chi_i(x, t))} e^{a\chi_i(x, t)}, & (x, t) \in G_l^i. \end{cases} \quad (9)$$

Нехай $\Lambda = \max_{i,x,t} |\lambda_i(x, t)|$, тоді для кожного $(x, t) \in \bar{G}$ одержимо оцінки [6]

$$\chi_i(x, t) \leq \frac{-x + \Lambda t}{\Lambda + k}, \quad i \in I_0, \text{ аналогічно, для } i \in I_l \text{ маємо } \chi_i(x, t) \leq \frac{x + \Lambda t - l}{\Lambda + k}.$$

На підставі отриманих оцінок для оператора A^1 одержимо

$$\begin{aligned} & \left| (A_i^1[w^1](x, t)) - (A_i^1[w^2](x, t)) \right| \alpha_i(x, t) e^{-at} \leq \\ & \leq L \max \left\{ \max_{\substack{i \in I_0, \\ j \notin I_0, \sigma}} \frac{\alpha_i(x, t) e^{a\left(\frac{-x + \Lambda t}{\Lambda + k} - t\right)}}{\alpha_j(-k\sigma, \sigma)}, \max_{\substack{i \in I_l, \\ j \notin I_l, \sigma}} \frac{\alpha_i(x, t) e^{a\left(\frac{x + \Lambda t - l}{\Lambda + k} - t\right)}}{\alpha_j(l + k\sigma, \sigma)} \right\} \rho(w^1, w^2) + \\ & + \int_0^t e^{a(\tau-t)} d\tau L \max \left\{ \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x, t)}{\alpha_j(y, \sigma)}, \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x, t)}{\beta_j(y, \sigma)}, \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x, t)}{\alpha_j(-k\sigma, \sigma)}, \right. \\ & \left. \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x, t)}{\beta_j(-k\sigma, \sigma)}, \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x, t)}{\alpha_j(k\sigma + l, \sigma)}, \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x, t)}{\beta_j(-k\sigma, \sigma)} \right\} \rho(w^1, w^2) \leq \\ & \leq L \max \left\{ \max_{\substack{i \in I_0, \\ j \notin I_0, \sigma}} \frac{\alpha_i(x, t) e^{a\frac{-x - kt}{\Lambda + k}}}{\alpha_j(-k\sigma, \sigma)}, \max_{\substack{i \in I_l, \\ j \notin I_l, \sigma}} \frac{\alpha_i(x, t) e^{a\frac{x - kt - l}{\Lambda + k}}}{\alpha_j(l + k\sigma, \sigma)} \right\} \rho(w^1, w^2) + \\ & + \frac{L}{a} \max \left\{ \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x, t)}{\alpha_j(y, \sigma)}, \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x, t)}{\beta_j(y, \sigma)}, \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x, t)}{\alpha_j(-k\sigma, \sigma)}, \right. \end{aligned}$$

$$\max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x,t)}{\beta_j(-k\sigma,\sigma)}, \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x,t)}{\alpha_j(k\sigma+l,\sigma)}, \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x,t)}{\beta_j(-k\sigma,\sigma)} \left\} \rho(w^1, w^2). \quad (10)$$

Для оператора A^2 отримаємо

$$\begin{aligned} |A_i^2[w^1](x,t) - A_i^2[w^2](x,t)| \beta_i(x,t) e^{-at} \leq & \left(L \max_{i,j \notin I_0} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(-kt,t)} + \right. \\ & + \int_{-kt}^x L \max \left\{ \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(y,t)}, \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\beta_j(y,t)}, \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(-kt,t)}, \right. \\ & \left. \left. L \max_{i,j \notin I_0} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(-kt,t)}, \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(kt+l,t)} \right\} dy \right) \rho(w^1, w^2). \quad (11) \end{aligned}$$

Із (8) та оцінок (10) і (11) одержуємо

$$\begin{aligned} \rho(A[w^1], A[w^2]) \leq & \max_{(x,t) \in G} \left\{ L \max \left\{ \max_{\substack{i \in I_0, \\ j \notin I_0, \sigma}} \frac{\alpha_i(x,t) e^{\frac{-x-kt}{\Lambda+k}}}{\alpha_j(-k\sigma,\sigma)}, \max_{\substack{i \in I_0, \\ j \notin I_0, \sigma}} \frac{\alpha_i(x,t) e^{\frac{x-kt-l}{\Lambda+k}}}{\alpha_j(l+k\sigma,\sigma)} \right\} + \right. \\ & + \frac{L}{a} \max \left\{ \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x,t)}{\alpha_j(y,\sigma)}, \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x,t)}{\beta_j(y,\sigma)}, \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x,t)}{\alpha_j(-k\sigma,\sigma)}, \right. \\ & \left. \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x,t)}{\beta_j(-k\sigma,\sigma)}, \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x,t)}{\alpha_j(k\sigma+l,\sigma)}, \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x,t)}{\beta_j(-k\sigma,\sigma)} \right\} + \\ & + L \max_{i,j \notin I_0} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(-kt,t)} + \int_{-kt}^x L \max \left\{ \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(y,t)}, \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\beta_j(y,t)}, \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(-kt,t)}, \right. \\ & \left. \left. L \max_{i,j \notin I_0} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(-kt,t)}, \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(kt+l,t)} \right\} dy \right\} \rho(w^1, w^2). \end{aligned}$$

Вибравши функції α_i, β_i так, щоб

$$\alpha_i(x,t) = \begin{cases} e^{p(kt+x)(kt-x+l)}, & i \in I_0, i \in I_l, \\ e^{p(kt+x)}, & i \in I_0, i \notin I_l, \\ e^{p(kt-x+l)}, & i \notin I_0, i \in I_l, \\ e^{p(2kt+l)}, & i \notin I_0, i \notin I_l, \end{cases}$$

$$\beta_i(x,t) = \varepsilon e^{-p(kt+x)},$$

покажемо, що коефіцієнт стиску оператора A менший від одиниці.

Нехай виконуються припущення $p \leq a\mu$, $pl - a\mu \leq -2pkT$, а $\mu = \frac{1}{\Lambda + k}$.

Тоді, дослідивши цю функцію на екстремум в $\bar{G}$, одержимо співвідношення

$$\begin{aligned} \max_{(x,t) \in G} \left\{ \max_{\substack{i \in I_p, \\ j \notin I_{0,\sigma}}} \frac{\alpha_i(x,t) e^{\frac{-x-kt}{\Lambda+k}}}{\alpha_j(-k\sigma, \sigma)}, \max_{\substack{i \in I_l, \\ j \notin I_{l,\sigma}}} \frac{\alpha_i(x,t) e^{\frac{x-kt-l}{\Lambda+k}}}{\alpha_j(l+k\sigma, \sigma)} \right\} &= \max_{(x,t) \in G} \left\{ \max_{\substack{i \in I_p, \\ j \notin I_{0,\sigma}}} \frac{\alpha_i(x,t) e^{a\mu(-x-kt)}}{\alpha_j(-k\sigma, \sigma)}, \right. \\ \left. \max_{\substack{i \in I_l, \\ j \notin I_{l,\sigma}}} \frac{\alpha_i(x,t) e^{a\mu(x-kt-l)}}{\alpha_j(l+k\sigma, \sigma)} \right\} &= \max_{(x,t) \in G} \left\{ \max_{i \in I_0} \frac{\alpha_i(x,t) e^{a\mu(-x-kt)}}{e^{pl}}, \max_{i \in I_l} \frac{\alpha_i(x,t) e^{a\mu(x-kt-l)}}{e^{pl}} \right\} = \\ &= \max_{(x,t) \in G} \left\{ \max \left\{ e^{p(kt+x)(kt-x+l)}, e^{p(kt+x)} \right\} e^{a\mu(-x-kt)-pl}, \right. \\ &\left. \max \left\{ e^{p(kt+x)(kt-x-l)}, e^{p(kt-x-l)} \right\} e^{a\mu(x-kt-l)-pl} \right\} = e^{-pl}. \end{aligned}$$

Також правильна оцінка

$$\begin{aligned} \max_{(x,t) \in G} \max_{i,j \notin I_0} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(-kt, t)} &= \max_{(x,t) \in G} \frac{\varepsilon e^{-p(kt+x)}}{e^{p(2kt+l)}} = \max_{(x,t) \in G} \varepsilon e^{-3pkt - px - pl} = \\ &= \max_t \varepsilon e^{-2pkt + pl} = \varepsilon e^{-pl}. \end{aligned}$$

Зрештою, проведемо оцінку для

$$\begin{aligned} \max_{(x,t) \in G} \int_{-kt}^x \max \left\{ \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(y,t)}, \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\beta_j(y,t)}, \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(-kt, t)}, L \max_{i,j \notin I_0} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(-kt, t)}, \right. \\ \left. \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(kt+l, t)} dy \right\} \leq \max_{(x,t) \in G} \int_{-kt}^x \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(y,t)} dy + \max_{(x,t) \in G} \int_{-kt}^x \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\beta_j(y,t)} dy + \\ + \max_{(x,t) \in G} \int_{-kt}^x \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(-kt, t)} dy + \max_{(x,t) \in G} \int_{-kt}^x L \max_{i,j \notin I_0} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(-kt, t)} dy + \\ + \max_{(x,t) \in G} \int_{-kt}^x \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(kt+l, t)} dy. \end{aligned}$$

Тоді

$$\begin{aligned} \max_{(x,t) \in G} \int_{-kt}^x \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(y,t)} dy &= \max_{(x,t) \in G} \int_{-kt}^x \varepsilon e^{-p(kt+x)} dy \leq \\ &\leq \max_{(x,t) \in G} \{ \varepsilon e^{-p(kt+x)}(x+kt) \} = \varepsilon(l+2kT), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\max_{(x,t) \in G} \int_{-kt}^x \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\beta_j(y,t)} dy &= \max_{(x,t) \in G} \int_{-kt}^x \frac{\varepsilon e^{-p(kt+x)}}{\varepsilon e^{-p(kt+y)}} dy = \max_{(x,t) \in G} \int_{-kt}^x e^{p(y-x)} dy = \\
&= \max_{(x,t) \in G} \frac{1}{p} (1 - e^{-p(kt+x)}) \leq \frac{1}{p}, \\
\max_{(x,t) \in G} \int_{-kt}^x \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(-kt,t)} dy &= \max_{(x,t) \in G} \int_{-kt}^x \max \left\{ \varepsilon e^{-p(kt+x)}, \frac{\varepsilon e^{-p(kt+x)}}{e^{p(2kt+l)}} \right\} dy \leq \\
&\leq \max_{(x,t) \in G} \{ \varepsilon e^{-p(kt+x)} (x + kt) \} = \varepsilon(l + 2kT), \\
\max_{(x,t) \in G} \int_{-kt}^x L \max_{i,j \notin I_0} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(-kt,t)} dy &= \max_{(x,t) \in G} \int_{-kt}^x L \frac{\varepsilon e^{-p(kt+x)}}{e^{p(2kt+l)}} dy = \\
&\leq L \max_{(x,t) \in G} \{ \varepsilon e^{-p(3kt+x+l)} (x + kt) \} = L \varepsilon e^{-pl} (l + 2kT), \\
\max_{(x,t) \in G} \int_{-kt}^x \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(kt+l,t)} dy &= \max_{(x,t) \in G} \int_{-kt}^x \max \left\{ \varepsilon e^{-p(kt+x)}, \frac{\varepsilon e^{-p(kt+x)}}{e^{p(2kt+l)}} \right\} dy \leq \\
&\leq \max_{(x,t) \in G} \{ \varepsilon e^{-p(kt+x)} (x + kt) \} = \varepsilon(l + 2kT).
\end{aligned}$$

Отже,

$$\begin{aligned}
\max_{(x,t) \in G} \int_{-kt}^x \max \left\{ \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(y,t)}, \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\beta_j(y,t)}, \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(-kt,t)}, L \max_{i,j \notin I_0} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(-kt,t)}, \right. \\
\left. \max_{i,j} \frac{\beta_i(x,t)}{\alpha_j(kt+l,t)} dy \right\} \leq 3\varepsilon(l + 2kT) + \frac{1}{p} + L\varepsilon e^{-pl} (l + 2kT).
\end{aligned}$$

Отож, визначаємо загальну оцінку

$$\begin{aligned}
\rho(A[w^1], A[w^2]) &\leq \left(L e^{-pl} + \frac{L}{a} \max_{(x,t) \in G} \left\{ \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x,t)}{\alpha_j(y,\sigma)}, \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x,t)}{\beta_j(y,\sigma)}, \right. \right. \\
&\max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x,t)}{\alpha_j(-k\sigma,\sigma)}, \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x,t)}{\beta_j(-k\sigma,\sigma)}, \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x,t)}{\alpha_j(k\sigma+l,\sigma)}, \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i(x,t)}{\beta_j(-k\sigma,\sigma)} \left. \right\} + \\
&\left. + L\varepsilon e^{-pl} + L \left(3\varepsilon(l + 2kT) + \frac{1}{p} + L\varepsilon e^{-pl} (l + 2kT) \right) \right) \rho(w^1, w^2).
\end{aligned}$$

Зафіксуємо додатні параметри p^*, ε^* так, щоб виконувалась нерівність

$$Le^{-p^*l} + L\varepsilon^* e^{-p^*l} + L \left(3\varepsilon^*(l + 2kT) + \frac{1}{p^*} + L\varepsilon^* e^{-p^*l}(l + 2kT) \right) < \frac{1}{2}.$$

Позначимо

$$M = \max_{(x,t) \in G} \left\{ \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i^*(x,t)}{\alpha_j^*(y,\sigma)}, \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i^*(x,t)}{\beta_j^*(y,\sigma)}, \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i^*(x,t)}{\alpha_j^*(-k\sigma,\sigma)}, \right. \\ \left. \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i^*(x,t)}{\beta_j^*(-k\sigma,\sigma)}, \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i^*(x,t)}{\alpha_j^*(k\sigma+l,\sigma)}, \max_{i,j,y,\sigma} \frac{\alpha_i^*(x,t)}{\beta_j^*(k\sigma+l,\sigma)} \right\},$$

де функції α_i^*, β_i^* дорівнюють, відповідно, функціям α_i, β_i при $p = p^*, \varepsilon = \varepsilon^*$.

Тепер зафіксуємо значення параметра a^* , щоб задовольнити нерівності

$$p^* \leq a^* \mu, \quad p^* l - a^* \mu \leq -2p^* kT, \quad \frac{LM}{a^*} < \frac{1}{2}.$$

Оскільки параметри p^*, ε^*, a^* завжди можна вибрати так, щоб коефіцієнт стиску оператора був меншим від одиниці, то оператор A є стискуючим на елементах простору $Q = Q^*$ з вибраними функціями $\alpha_i = \alpha_i^*, \beta_i = \beta_i^*$ та параметром $a = a^*$. Отже, згідно з теоремою Банаха узагальнений неперервний розв'язок задачі (1)–(4) існує і єдиний. Теорему доведено.

Список використаної літератури

1. Васильева А.Б. Асимптотические методы в теории сингулярных возмущений / А.Б. Васильева, В.Ф. Бутузов. – М.: Высш. шк., 1990.
2. Громяк М.И. Асимптотические методы исследования квазиволновых уравнений гиперболического типа / М.И. Громяк, Ю.А. Митропольский, Г.П. Хома. – К.: Наук. думка, 1991.
3. Кирилич В.М. Обобщенная непрерывная разрешимость задачи с неизвестными границами для сингулярных гиперболических систем квазилинейных уравнений / В.М. Кирилич, А.М. Филимонов // Матем. студії. – 2008 – Т. 30. – №1. – С. 42–60.
4. Florescu D. Asupra existentei solutiilor unor sisteme hiperbolice de tip special / D. Florescu // Studii si cerc. Mat. – 1978. – Т.30, No.3. – Р. 279–285.
5. Рождественский Б. Л. Системы квазилинейных уравнений и их приложения к газовой динамике / Б. Л. Рождественский, Н. Н. Яненко. – М.: Наука, 1978.

6. Мауленов О. О. разрешимости смешанной задачи для вырожденной полулинейной гиперболической системы на отрезке. / О. Мауленов, А. Д. Мышкис // Изв. АН КазССР. Сер. Физ.-мат. – 1981. – №5. – С. 25–29.

ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ НАГРУЖЕННОЙ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЛУЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Ольга ПЕЛЮШКЕВИЧ

*Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
ул. Университетская, 1 79000 Львов, Украина*

Рассмотрено разрешимость смешанной задачи с горизонтальными характеристиками для полулинейной нагруженной гиперболической системы уравнений первого порядка. Методом характеристик задача сведена к системе интегро-операторных уравнений Вольтерра второго рода, для которой с помощью теоремы Банаха о сжимающем отображении установлено достаточные условия существования глобального непрерывного решения задачи.

Ключевые слова: гиперболическая система, метод характеристик, полулинейные уравнения, теорема Банаха.

ABOUT ONE PROBLEM FOR LOADED HYPERBOLIC SYSTEM OF SEMILINEAR EQUATIONS WITH HORIZONTAL CHARACTERISTICS

Olga PELIUSHKEVYCH

*Ivan Franko National University of Lviv,
Universytetska Str., 1 79000 Lviv, Ukraine*

The solvability of the mixed problem with horizontal characteristics for the loaded semilinear hyperbolic system of the first order equations is considered. Applying the method of characteristics a problem was reduced to the system of Volterra the second order integro-operation equations, for which the sufficient conditions of existence of global continuous solution by Banach's theorem about a contractive mapping are established.

Key words: Banach theorem, hyperbolic system, quasi-linear equations, method of characteristic, semilinear equations.

Стаття надійшла до редколегії 16.11.2011

Прийнята до друку 31.05.2012